



Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u Dimexanol™ gebruikt en bewaar deze zorgvuldig, het bevat belangrijke informatie. Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer informatie of advies wilt of wanneer u na inname van Dimexanol™ ongewone bijwerkingen ervaart.

1. Waarvoor wordt Dimexanol™ gebruikt

- Dankzij zijn unieke 2-in-1-formule behandelt Dimexanol™ effectief acute en chronische diarree en bevordert het tevens de rehydratie (vocht-aanvulling):
- Het isoleert de stoffen die diarree veroorzaken en voert deze via de ontlasting af. Bovendien beschermt het de darmwand en helpt het waterige ontlasting weer normaal te maken. Dimexanol™ heeft daarbij geen effect op de peristaltiek van de darmen (darmwerking wordt niet stilgelegd).
- Vult het tekort aan vocht en zouten weer aan om uitdroging bij diarree te voorkomen (O.R.S.).

2. Wat is Dimexanol™

Bruistabletten met Morilyte™, een natuurlijke eetbare klei met een 3-lagen structuur en een bindcapaciteit die hoger is dan die van de meeste klei-soorten. Deze structuur zorgt voor een hoge kationuitwisselingscapaciteit en voor het vermogen om virussen, giftige stoffen en bacteriën vast te houden. Daarnaast bevatten de tabletten ook dextrose, citroenzuur, calciumcarbonaat, natriumchloride, kaliumbicarbonaat, natriumbicarbonaat, sinaasappel-grapefruitaroma, aspartaam en acesulfaam K.

3. Hoe gebruikt u Dimexanol™

- Bruistabletten met lekkere smaak voor orale inname.
- De bruistablet in een half glas water (circa 125 ml) oplossen en opdrinken.
- Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: neem 3x daags 1 tablet.
- Kinderen jonger dan 12 jaar: gebruik Dimexanol™ voor kinderen.
- Als u een dosis vergeet, hoeft u de volgende dosis niet te verdubbelen, ga gewoon verder met de behandeling indien nodig.
- Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosering niet. Overdosering kan tot obstipatie (verstopping) leiden. Als u de dagelijkse dosering overschreden hebt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg uw arts als de symptomen na drie dagen nog aanhouden.

Deze behandeling neemt de behoefte aan vocht- en elektrolyttherapie niet weg wanneer die nodig is, vooral bij kinderen en oudere patiënten.

4. Voor gebruik van Dimexanol™

- Als u een zeer natriumarm dieet volgt: gebruik Dimexanol™ dan niet.
- Als u fenylketonurie of nieraandoeningen hebt: gebruik Dimexanol™ dan niet.
- Als u allergisch bent voor één van de ingrediënten: gebruik Dimexanol™ dan niet.
- Als u een voorgeschiedenis van ernstige obstipatie hebt: gebruik Dimexanol™ met voorzorg gebruiken.
- Als u medicijnen gebruikt: het wordt aanbevolen om ten minste 2 uur vóór het innemen van Dimexanol™ en 2 uur daarna geen andere medicijnen te gebruiken. Meld het aan uw arts of apotheker als u andere medicatie neemt of recent hebt genomen. Dit geldt ook voor medicatie die zonder voorschrift verkrijgbaar is.
- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft: het is raadzaam om vóór gebruik uw arts of apotheker te raadplegen.

5. Na inname van Dimexanol™

- Zoals alle producten kan Dimexanol™ bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen die ervaart en deze gewoonlijk mild van aard zijn.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Stop bij een allergische reactie met het nemen van Dimexanol™ en raadpleeg uw arts. De symptomen kunnen o.a. omvatten: uitslag, problemen bij slikken of ademen, zwelling van de lippen, gezicht, keel of tong.
- Als een medische aandoening optreedt na inname van Dimexanol™, raadpleeg dan uw arts.

6. Hoe bewaart u Dimexanol™

- Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
- Houd het buisje goed gesloten en bewaar het op een koele, droge plaats (beneden 25°C).
- De drank meteen na bereiding innemen. Gooi resterende drank na 1 uur weg (of na 6 uur indien deze in de koelkast bewaard is). Roer goed voor het drinken.
- Niet gebruiken na de vervaldatum: zie verpakking en buisje.
- Dit product mag niet afgevoerd worden via het afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe producten die niet langer nodig zijn, afgevoerd moeten worden. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

Dimexanol™ is een product van Bional Medical. De maag-darmproducten van Bional Medical zijn doeltreffende producten van natuurlijke oorsprong die wetenschappelijk zijn bewezen. Is uw maag- darmstelsel om welke reden dan ook uit balans? Dan biedt Bional Medical eenvoudige oplossingen die u helpen het evenwicht te herstellen en uw maag- darmstelsel gezond te houden.

- Bional Medical **Regulamine™ sachets**: voor een regelmatige stoelgang en goede darmbalans.
- Bional Medical **Reduflux™ tabletten en vloeibare sachets**: bij brandend maagzuur en zure oprispingen. Werkt snel en tot wel 4 uur lang.
- Bional Medical **Redugas™**: snelle maar zachte verlichting bij een opgeblazen gevoel en windigheid door herstel van de darmflora.
- Bional Medical **Dimexanol™ en Dimexanol™ voor kinderen**: effectieve, natuurlijke 2-in-1-behandeling voor diarree die de symptomen behandelt en het vochttekort in het lichaam aanvult.

Dit zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Kijk voor meer informatie op www.bional.nl

Fabrikant:

InQpharm Europe Ltd., Waldseeweg 6, 13467 Berlijn, Duitsland

Distributeur:

Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612,
3002 AP Rotterdam, Nederland



Dimexanol™ is een gecertificeerd medisch hulpmiddel waarvan de veiligheid en doeltreffendheid bepaald werden onder richtlijn 93/42/EEG betreffende Medische Hulpmiddelen.

Datum aangepast

Oktober 2012



MEDICAL

2150A



0197